Imprimerie de la Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant : L. BOUYX

AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP -9-6-7.1 185725

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F Régisseur de recettes D.D.A. 2, Rue des Mineurs 67 - STRASBOURG

Supplément nº 1 au Bulletin nº 129 du mois de Juin.

8 Juin 1971

VIGNE

MILDIOU

Les conditions climatiques actuelles sont favorables aux contaminations et des attaques de Mildiou sur grappes sont à craindre. D'autre part, la poussée végétative a été très forte depuis la dernière application. Une surface foliaire importante se trouve sans protection.

Les premières taches de Mildicu, très isolées, sont maintenant visibles. En conséquence, nous conseillons d'effectuer un deuxième traitement dès réception de la présente Note.

Les manifestations de la maladie sont beaucoup plus tardives que l'on pouvait le craindre. Cette situation est certainement due à la sécheresse du printemps et au déficit en eau du sol, qui ont réduit considérablement la faculté germinative des ceufs d'hiver.

OIDIUM

Ajouter un Soufre mouillable à la bouillie Mildiou. Le Soufre sera également efficace contre l'Acariose, qui se développe assez dangereusement dans de nombreuses parcelles.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS


CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Bien que les vols se poursuivent dans nos élevages, les températures crépusculaires de ces derniers jours sont défavorables à l'activité sexuelle des papillons dans les vergers. Présentement, un deuxième traitement insecticide, combiné avec le traitement Tavelure, ne pourraît être envisagé qu'avec un produit jouissant d'une longue rémanence.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

La baisse des températures enregistrée depuis le 4 Juin a freiné la maturité des dernières ascospores. Les dernières projections se situeront donc légèrement plus tard que nous le laissions entendre dans notre Bulletin du mois de Juin.

.../...



Des contaminations primaires restant toujours possibles, un dernier traitement fongicide devra être réalisé le 11 ou le 12 Juin.

Dans les vergers contaminés par les Tavelures, la protection sera à poursuivre jusqu'à la récolte.

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Etendre à l'ensemble des cultures, le traitement recommandé dans notre Bulletin du mois de Juin.

DORYPHORE

Les premières larves sont en voie d'installation. N'intervenir que lorsque les larves auront la grosseur d'un grain de blé, en choisissant l'un des produits figurant sur la liste des pesticides en votre possession.

CULTURES MARAICHERES

TEIGNE DU POIREAU

Des pontes sont actuellement déposées et les premières éclosions ont lieu dans les expositions chaudes.

Un traitement devra être réalisé à partir du 11 Juin.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements agricoles : C. GACHON et Ch. JANUS. L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Bulletin nº 129 du mois de Juin 1971 publié en date du 2 Juin 1971